

Záznam o informovaném souhlasu s aplikací vakcíny SPIKEVAX – 2. preventivní posilovací dávka („4. dávka“)

Jméno a příjmení pacienta

Bydliště Pojišťovna

--	--	--

Rodné číslo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--

 Mobilní tel. číslo:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDIKAČNÍ SKUPINA (označte a doplňte datum posledního očkování proti Covid-19):
☐ **2. Posilovací dávka – datum podání 3. dávky (1. posilovací) očkování proti COVID-19:**
Minimální odstup od 3. dávky (1. posilovací) je 4 měsíce!!
Vážený pane, vážená paní,

dostavil/a jste se dobrovolně k aplikaci 2. posilovací dávky očkovací látky (SPIKEVAX) proti nemoci COVID-19. Očkovací látka SPIKEVAX je určena k prevenci nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tento dokument obsahuje informace, které Vám mají pomoci porozumět prospěchu a rizikům spojeným s podáním vakcíny. Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další otázky, poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo očkovacím personálem. Očkovací látka neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19

CO BYSTE MĚL(A) SDĚLIT PŘED OČKOVÁNÍM ZDRAVOTNICKÉMU PERSONÁLU?

Prosíme o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který lékaři pomůže určit, zda by pro Vás z očkování mohlo vyplynout nějaké speciální riziko. Pokud u Vás probíhá onemocnění COVID-19, je na něj podezření nebo jste v karanténě kvůli kontaktu s nemocnou osobou, neměli byste na očkování chodit, protože můžete ohrozit očkovací personál a ostatní očkované, se kterými přijdete do kontaktu v očkovacím centru.

Tento dotazník nám pomůže určit, zda by se dnešní očkování mělo provést nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte „ano“, neznamená to, že nemůžete být očkovan(a). Pokud Vám některá otázka není jasná, nechte si ji vysvětlit od očkovacího personálu.

	ANO	NE
Cítíte se dnes nemocný(á)?		
Měl(a) jste pozitivní PCR/antigenní test na COVID-19 v posledních 14 dnech nebo jste v izolaci/karanténě?		
Měl(a) jste někdy závažnou alergickou (tzv. anafylaktickou) reakci, pro kterou jste musel/a být léčen(a) adrenalinem nebo hospitalizován(a)? Měl jste závažnou reakci po očkování proti COVID-19?		
Měl jste perikarditidu/myokarditidu (zánět srdečního svalu) po předchozím očkování proti COVID-19?		
Máte nějakou krvácivou poruchu nebo užíváte Warfarin?		
Jste těhotná?		
Přejete si před aplikací očkovací látky konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem?		

KDO BY NEMĚL BÝT VAKCÍNOU SPIKEVAX OČKOVÁN?

Vakcínou nesmí být očkovaná osoba, která měla závažnou alergickou reakci po předchozí dávce/dávkách. Vakcína je též kontraindikována u osob, které měly v minulosti závažnou alergickou reakci na kteroukoliv pomocnou látku ve vakcíně obsaženou. Pokud jste měli v minulosti závažnou alergickou reakci, musíte o tom informovat očkovací personál.

JAK SE VAKCÍNA SPIKEVAX PODÁVÁ A JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO PODÁNÍ?

Vakcína Vám bude aplikována injekčně do svalu na rameni v množství 0,25ml. Podmínky pro podání jsou následující:

1. Podání **2. preventivní posilovací dávky** je dle rozhodnutí MZČR z 15.7.2022 (na základě doporučení ČLS JEP) možné od 18.7.2022 pro osoby, které mají **nejméně 4 měsíce** po aplikaci 3. posilovací dávky osobám starším 18ti let.
2. Druhá posilovací dávka se nepodává u osob, které mají hypersenzitivitu na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku dané vakcíny a u osob, u kterých se projevila myokarditida nebo perikarditida jako známý, ale velmi vzácný nežádoucí účinek mRNA vakcín.

JAKÉ MÁ VÝHODY OČKOVÁNÍ 2. POSILOVACÍ DÁVKOU?

Je prokázáno, že po určité době (individuální u každé osoby) dochází k postupnému poklesu účinnosti ochrany po očkovaní, a tedy k vyšší pravděpodobnosti nákazy u očkovaného jedince. Tímto poklesem ochrany jsou nejvíce ohroženy starší osoby (nad 60 let), osoby s poruchou imunity a nebo osoby trpící chronickým onemocněním (typické i pro jiná očkovaní). Posilující dávka významně zvýší ochranu proti naze.

Podání posilující dávky také posílí ochranu i proti novým variantám koronaviru (např. omikron), které v době vývoje očkovacích látek nebyly známy, avšak aktuálně se ve světě šíří. **Hladina protilátek není ekvivalentem ochrany očkovaním.**

JAKÁ S SEBOU NESE OČKOVÁNÍ RIZIKA?

U více než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout bolest nebo zduření v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka, zduření v podpaží, nevolnost, zvracení.

U méně než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout vyrážka, zarudnutí nebo kopřivka v místě injekce.

U méně než jednoho očkovaného ze sta se může vyskytnout svědění v místě injekce.

Někteří lidé mohou vzácně mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se nejčastěji projevuje jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře nebo v mimopracovní dny navštivte pohotovostní lékařskou službu.

V případě ohrožení života a zdraví volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě můžete být také ohrožen(a) na životě.

Vzácné nežádoucí účinky se v probíhajících studiích i rozsáhlých vakcinačních kampaních stále sledují.

JAK SNÍŽIT RIZIKO ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ?

Po každém očkovaní je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení 15 minut po vakcinaci. V následných dnech po očkovaní se doporučuje dodržovat alespoň další 3 dny klidový režim. V případě rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Pročetl/a jsem, porozuměl/a jsem textu a měl/a jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu, který by mi bránil v aplikaci této očkovací látky, a všechny mnou zadané údaje jsou pravdivé. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možnými vedlejšími účinky. Těmito informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl/a jsem poučen/a o způsobu aplikace vakcíny a povakcinačním režimu. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a beru na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo.

Souhlasím s provedením očkovaní.

Podpis očkovaného:

Datum:

Podpis očkovacího zdravotníka:

Datum:

Zde vyplní pracovník zařízení, kde bude vakcína podána:

#	Datum očkovaní	Sériové číslo/datum expirace	Místo vpichu (nehodící škrtnout)		Vakcínu podal (iniciály)
4. dávka			P paže	L paže	