


INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

s poskytnutím zdravotních služeb a provedením zdravotních výkonů

Pacient:

Identifikační štítek

pacienta



Druh výkonu:

**Operace kožního a
podkožního útvaru****Informace pro pacienta:**

Vážená pacientko, vážený paciente,

bylo Vám navrženo provedení výše uvedeného zdravotního výkonu. Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku a seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohli/a rozhodnout a dát k provedení výkonu svůj souhlas.

Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby:

Odstranění kožního nebo podkožního útvaru na doporučení dermatologa nebo jiného specialisty. Jedná se o výkony téměř vždy plánované, někdy pouze z kosmetického důvodu.

Operace: Před výkonem nejsou žádná zásadní omezení. Dle velikosti ložiska lze výkon provést v lokální anestezii. Anestetikum (nejčastěji 1% Mesocain nebo 0,5% Marcain) se aplikuje tenkou jehlou do kůže a podkoží operované oblasti. K operaci větších útvarů je vhodná celková nebo svodná anestezie. Operovaná oblast se nejprve natře dezinfekčním roztokem a sterilně zarouškuje. Kožním řezem (většinou čokovitého tvaru) se kožní útvar odstraní. Řez se vede do zdravé tkáně a jeho velikost závisí na více faktorech (doporučení dermatologa, velikost útvaru, předchozí výkony v oblasti atd.). Podrobnější informace Vám poskytne lékař. Odstranění podkožní tukové bulky nebo ateromu (ucpaná mazová žláza obsahující maz) se provádí řezem nad útvarem, kterým se proniká do podkoží. Bulka se oddělí od okolních tkání a vyjme se z rány. Výkon končí zašitím operační rány. Pokud je vzniklý defekt příliš velký, lze jej uzavřít kožní plastikou nebo přenosem volné kůže z jiného místa těla. Někdy je do rány zaveden drén, který se odstraní zpravidla 1. - 2. den po operaci. Většinou je odstraněná tkáň odeslána k histologickému rozboru. Výhody výkonu jsou možnost odeslání odstraněné tkáně k histologickému rozboru u podezřelých nálezů. Nevýhody výkonu jsou komplikace (viz dále).

Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby:

Odstranění kožního nebo podkožního útvaru.

Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou:**Obecné komplikace:**

Alergie: (občas) Alergická reakce na podané léky, na použitý dezinfekční prostředek, šicí materiál atd. je většinou lokální nebo celková kožní a sama odezní nebo se dá řešit léky. Velmi vzácná je celková alergická reakce charakteru anafylaktického šoku. U některých alergiků se preventivně podává protialergická léčba.

Trombóza: (výjimečně) Trombóza je vznik krevní sraženiny v žilním řečišti. Jako prevence vzniku trombózy v souvislosti s operačním výkonem jsou většině pacientů aplikovány injekčně léky k prevenci vzniku trombózy, většinou před výkonem a několik dní po výkonu. Na dolní končetiny se před výkonem nasazují elastické kompresivní punčochy. Jako prevence trombózy po operačním výkonu slouží i časná mobilizace a rehabilitace pacienta. U vybraných diagnóz je vhodná aplikace injekčních léků, kterou zvládne pacient (po proškolení sestrou) i v domácím prostředí.

Další: Jedná se o komplikace dýchacích cest, např. zánět hrtanu, průdušek nebo zánět plic. Dále se může vyskytnout zánět povrchových žil a podkoží po aplikaci léčiv a dočasná poléková porucha funkce jater a další.

Chirurgické komplikace:

Zvracení: (občas - reakce na anestezii). Problém sám odezní nebo se dá zvládnout léky.

Bolesti: (často) Bezprostředně po operaci se mohou objevit bolesti břicha, v ráně nebo ramen následkem naplnění dutiny břišní plynem při laparoskopické operaci, které lze řešit podáním analgetik.

Poruchy močení: (výjimečně) Po operaci vzniknou potíže s močením, které je nutno vyřešit přechodným zavedením močového katetru. Močový katétr může být občas příčinou vzniku močové infekce.

Zvýšená teplota: (často) Přechodně zvýšená teplota po dobu 12-48h se většinou sama upraví.

Dočasná porucha střevní činnosti: (občas) Po břišní operaci může dojít k dočasné zástavě odchodu plynů a stolice, která se většinou sama upraví nebo se dá snadno ovlivnit léky. Vzácně je nutná reoperace.

Krvácení: (vzácně) Jedná se o krvácení z větších cév v dutině břišní nebo z cév v blízkosti operovaného orgánu. Někdy je nutné převést laparoskopický výkon na otevřený. Výjimečně je nutné pro pokračující krvácení provést další operační výkon k zastavení krvácení. Při větší ztrátě krve je často nutné podání krevní transfuze.

Komplikace hojení rány: Může dojít ke krvácení z operační rány (občas), rozestup okrajů operační rány (vzácně), zánětům kůže a podkoží u operační rány (občas), vznik hypertrofické keloidní jizvy (občas). Infekce rány se projeví bolestivostí v ráně, zarudnutím, někdy tvorbou hnisu a zvýšenou teplotou. Tato komplikace si vyžádá opakované převazy. Větší krvácení nebo rozestup rány může vyžadovat operační revizi.

Konkrétní komplikace související s operací:

Recidiva: (vzácně) S odstupem může dojít k znovuobjevení útvaru, řešení je opět chirurgické. Pokud histologický rozbor prokáže, že útvar nebyl odstraněn celý a buňky dosahují okrajů, je vhodné a někdy nutné výkon zopakovat a rozšířit řez.

Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a poučení o možnosti volby:

Konzervativní terapie: Většinou se jedná o kosmetické výkony, tudíž nepodstoupení operace nepředstavuje žádné riziko. Konzervativní terapie je nevhodná pouze u nálezu podezřelých z nádorového onemocnění.

Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu, léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb:

Dieta - nejsou žádná omezení. **Režim** - nejsou většinou žádná omezení pracovní schopnosti. 2-3 týdny není vhodné koupání, sportování, výraznější fyzická námaha a pobyt v prašném prostředí. Do vyblednutí jizev není vhodné je vystavovat slunečnímu záření nebo docházet do solária. Pooperačně jsou vhodné masáže jizev a promazávání. Před operací se doporučuje přestat kouřit ke zlepšení prokrvení tkání a hojení. Po výkonu následuje několik ambulantních kontrol. Stehy se odstraňují 4. - 14. den dle lokality a výkonu.

Prohlašuji,

- že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli,
- že jsem lékařům nezamítl/a žádné mně známé informace o mém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby,
- že jsem byl/a informován/a, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Byl/a jsem rovněž poučen/a, že odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození mého zdraví nebo ohrožení mého života,
- že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a **vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas** s uvedenými zdravotními službami a výkony.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležitě odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.

Podpis pacienta (zákonného zástupce):

Poznámky lékaře k rozhovoru s pacientem:

Podpis lékaře:

Datum:
