

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

s poskytnutím zdravotních služeb a provedením zdravotních výkonů


Pacient:

Identifikační štítek

pacienta

Druh výkonu:

**Operace zánětlivého
postižení měkkých tkání**



Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, vážený paciente,
bylo Vám navrženo provedení výše uvedeného zdravotního výkonu. Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku a seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení výkonu svůj souhlas.

Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby:

Účelem výkonu je operační řešení zánětu měkkých tkání. Flegmona je zarudnutí kůže, jedná se o zánětlivou reakci na poranění nebo průnik cizího tělesa. Je-li přítomen hnis a tvoří-li dutinu vyplněnou hnisem, jedná se o absces. Absces nebo flegmóna se mohou vyskytovat na kterékoliv části těla, častěji však v terénu horší hygieny, kožních záhybů, prstech nohy a ruky, v oblasti genitálií apod. Dispozice k tvorbě abscesů a ke zhoršenému hojení mají pacienti s diabetem (cukrovkou), sníženou imunitou, oslabení závažným onemocněním nebo na částech těla se zhoršeným prokrvením (dolní končetiny u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin). Velmi rizikové jsou rány pokousáním zvířetem nebo člověkem a rány nožem od masa. Pokud selže antibiotická léčba, je nutné přistoupit k chirurgickému řešení.

Dle lokalizace a velikosti postižení se výkon provádí v lokální nebo celkové anestezii. Aplikace lokální anestezie do zánětem postižené tkáně může být bolestivá a nepříjemná, proto Vám může lékař doporučit výkon v celkové anestezii. Anestetikum (nejčastěji 1% Mesocain nebo 0,5% Marcain) se aplikuje tenkou jehlou do kůže a podkoží. Operovaná oblast se nejprve natře dezinfekčním roztokem a sterilně zarouškuje. Kožním řezem se uvolní abscesové ložisko, vypláchne se hnis, který se předá k mikrobiologickému vyšetření. Výsledky mikrobiologického vyšetření jsou většinou k dispozici za dva až tři dny a na jejich základě se může změnit antibiotická léčba, pokud neprobíhá hojení podle očekávání. Ne vždy je však antibiotická léčba nutná, často u zdravého jedince postačí uvolnění hnisu a vypláchnutí. Velmi často se do abscesové dutiny vkládá drén, který se ponechává několik dnů. Hnisavé rány se nešíjí, ponechávají se hojit otevřeně. Kosmetické výsledky jsou velmi dobré, v případě nevzhledné jizvy lze s odstupem po odeznění zánětu jizvu upravit. S drénem je možný pobyt v domácím prostředí. Někdy je nutné postiženou část končetiny znehybnit sádrovým obvazem.

Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby:

Operací se často zánět vyřeší, kromě jizvy nezanechá zákrok žádné trvalé následky.

Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou:

Obecné komplikace:

Alergie: (občas) Alergická reakce na podané léky, na použitý dezinfekční prostředek, šicí materiál atd. je většinou lokální nebo celková kožní a sama odezní nebo se dá řešit léky. Velmi vzácná je celková alergická reakce charakteru anafylaktického šoku. U některých alergiků se preventivně podává protialergická léčba.

Trombóza: (výjimečně) Trombóza je vznik krevní sraženiny v žilním řečišti. Jako prevence vzniku trombózy v souvislosti s operačním výkonem jsou většině pacientů aplikovány injekčně léky k prevenci vzniku trombózy, většinou před výkonem a několik dní po výkonu. Na dolní končetiny se před výkonem nasazují elastické kompresivní punčochy. Jako prevence trombózy po operačním výkonu slouží i časná mobilizace a rehabilitace pacienta. U vybraných diagnóz je vhodná aplikace injekčních léků, kterou zvládne pacient (po proškolení sestrou) i v domácím prostředí.

Další: Jedná se o komplikace dýchacích cest, např. zánět hrtanu, průdušek nebo zánět plic. Dále se může vyskytnout

zánět povrchových žil a podkoží po aplikaci léčiv a dočasná poléková porucha funkce jater a další.

Chirurgické komplikace:

Zvracení: (občas - reakce na anestezii). Problém sám odezní nebo se dá zvládnout léky.

Bolesti: (často) Bezprostředně po operaci se mohou objevit bolesti břicha, v ráně nebo ramen následkem naplnění dutiny břišní plynem při laparoskopické operaci, které lze řešit podáním analgetik.

Poruchy močení: (výjimečně) Po operaci vzniknou potíže s močením, které je nutno vyřešit přechodným zavedením močového katetru. Močový katétr může být občas příčinou vzniku močové infekce.

Zvýšená teplota: (často) Přechodně zvýšená teplota po dobu 12-48h se většinou sama upraví.

Dočasná porucha střevní činnosti: (občas) Po břišní operaci může dojít k dočasné zástavě odchodu plynů a stolice, která se většinou sama upraví nebo se dá snadno ovlivnit léky. Vzácně je nutná reoperace.

Krvácení: (vzácně) Jedná se o krvácení z větších cév v dutině břišní nebo z cév v blízkosti operovaného orgánu. Někdy je nutné převést laparoskopický výkon na otevřený. Výjimečně je nutné pro pokračující krvácení provést další operační výkon k zastavení krvácení. Při větší ztrátě krve je často nutné podání krevní transfuze.

Komplikace hojení rány: Může dojít ke krvácení z operační rány (občas), rozestup okrajů operační rány (vzácně), zánětům kůže a podkoží u operační rány (občas), vznik hypertrofické keloidní jizvy (občas). Infekce rány se projeví bolestivostí v ráně, zarudnutím, někdy tvorbou hnisu a zvýšenou teplotou. Tato komplikace si vyžádá opakované převazy. Větší krvácení nebo rozestup rány může vyžadovat operační revizi.

Konkrétní komplikace související s operací:

Nevzhledná jizva: (občas) Jizvy nebývají problémem po odeznění zánětu. Pokud přesto dojde k vytvoření nevyhovující jizvy, je možné ji po odeznění zánětu chirurgicky upravit.

Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a poučení o možnosti volby:

Konzervativní terapie: Antibiotickou léčbu lze pokračovat bez operace. Výhody jsou omezení rizik vyplývajících z výkonu. Nevýhody jsou prodloužené hojení a riziko rozšíření zánětu do celého těla, postižení kostí, šlachových pochev, vzácně s následkem smrti.

Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu, léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb:

Dieta - nejsou žádná omezení. **Režim** - pracovní neschopnost se doporučuje 1-2 týdny dle vykonávaného povolání a lokalizaci zánětu. 2-3 týdny není vhodné koupání, sportování, výraznější fyzická námaha a pobyt v prašném prostředí. Kontroly probíhají ambulantně a v domácím prostředí je vhodné dle pokynů lékaře místo operace sprchovat a převazovat. Obecně se doporučuje přestat kouřit ke zlepšení prokrvení tkání a hojení.

Prohlašuji,

- že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli,
- že jsem lékařům nezamlčel/a žádné mně známé informace o mém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby,
- že jsem byl/a informován/a, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Byl/a jsem rovněž poučen/a, že odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození mého zdraví nebo ohrožení mého života,
- že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a **vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas** s uvedenými zdravotními službami a výkony.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležitě odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.

Podpis pacienta (zákonného zástupce):

Poznámky lékaře k rozhovoru s pacientem:

Podpis lékaře:

Datum: