


## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

s poskytnutím zdravotních služeb a provedením zdravotních výkonů

Pacient:

Identifikační štítek

pacienta



Druh výkonu: **Plastika kožního defektu**

### Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, vážený paciente,

bylo Vám navrženo provedení výše uvedeného zdravotního výkonu. Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku a seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohli/a rozhodnout a dát k provedení výkonu svůj souhlas.

#### **Účel, povaha, předpokládaný přínos zdravotního výkonu nebo služby:**

Kožní defekt (místo kde je porušena kůže) může vzniknout po úrazu, následkem popáleniny, zánětu nebo po odstranění většího kožního útvaru, kdy nebylo možné pro nedostatek tkáně sešít okraje kůže k sobě. Defekt se může ponechat k otevřenému hojení, což však může trvat řádově týdny až měsíce. Nejpomalejší hojení je v místech horšího prokrvení, například bérce, naopak rychlé hojení probíhá v obličejí a na ruce, kde je prokrvení většinou dobré. Hojení defektů se zhoršuje věkem, přidruženými chorobami a životou správou (kouření výrazně zhoršuje hojení).

Za účelem rychlejšího hojení je možné defekt překrýt kožním lalokem nebo kožním transplantátem. Operace se provádí většinou v celkové nebo svodné anestezii, výjimečně v lokální anestezii. Kožní lalok pochází z okolí defektu, je tvořen kůží a podkožím, někdy i svalem. Okraje laloku se sešijí. Rána nesmí být pod napětím, jinak je šance na zhojení malá. Pokud by hrozilo přílišné napětí, je vhodný přenos kožního transplantátu. Tím je velmi tenká vrstva kůže (do milimetru), která se seřízne speciálním tenkým nožem na jiném místě těla (vnitřní strana paže, podbřišek, stehno, hýždě, obličej, krk), upraví se, aby vznikla velká plocha, přiloží se na defekt a kryje obvazem. Řádově ve dnech dojde k prorůstání cév a přihojení. O vhodném řešení, konkrétně pro Vás, Vás bude informovat lékař. Předpokladem k úspěšné operaci je dobré prokrvení postižené oblasti a nepřítomnost choroboplodných zárodků, což se ověří stěrem z rány a mikrobiologickým vyšetřením. Doba hospitalizace je většinou několik dní, závisí na velikosti defektu, hojení a přidružených chorobách.

#### **Předpokládané důsledky a následky zdravotního výkonu nebo služby:**

Zhojení defektu, v případě odběru kožního štěpu vzniká trvalá jizva v místě odběru.

#### **Možná rizika spojená se zdravotním výkonem nebo službou:**

##### **Obecné komplikace:**

**Alergie:** (občas) Alergická reakce na podané léky, na použitý dezinfekční prostředek, šicí materiál atd. je většinou lokální nebo celková kožní a sama odezní nebo se dá řešit léky. Velmi vzácná je celková alergická reakce charakteru anafylaktického šoku. U některých alergií se preventivně podává protialergická léčba.

**Trombóza:** (výjimečně) Trombóza je vznik krevní sraženiny v žilním řečišti. Jako prevence vzniku trombózy v souvislosti s operačním výkonem jsou většině pacientů aplikovány injekčně léky k prevenci vzniku trombózy, většinou před výkonem a několik dní po výkonu. Na dolní končetiny se před výkonem nasazují elastické kompresivní punčochy. Jako prevence trombózy po operačním výkonu slouží i časná mobilizace a rehabilitace pacienta. U vybraných diagnóz je vhodná aplikace injekčních léků, kterou zvládne pacient (po proškolení sestrou) i v domácím prostředí.

**Další:** Jedná se o komplikace dýchacích cest, např. zánět hrtanu, průdušek nebo zánět plic. Dále se může vyskytnout zánět povrchových žil a podkoží po aplikaci léčiv a dočasná poléková porucha funkce jater a další.

##### **Chirurgické komplikace:**

**Zvracení:** (občas - reakce na anestezii). Problém sám odezní nebo se dá zvládnout léky.

**Bolesti:** (často) Bezprostředně po operaci se následkem naplnění dutiny břišní plynem při laparoskopické operaci mohou objevit bolesti břicha, ramen nebo v ráně, které lze řešit podáním analgetik.

**Poruchy močení:** (výjimečně) Po operaci vzniknou potíže s močením, které je nutno vyřešit přechodným zavedením močového katetru. Močový katetr může být občas příčinou vzniku močové infekce.

**Zvýšená teplota:** (často) Přechodně zvýšená teplota po dobu 12 - 48h se většinou sama upraví.

**Dočasná porucha střevní činnosti:** (občas) Po břišní operaci může dojít k dočasné zástavě odchodu plynů a stolice, která se většinou sama upraví nebo se dá snadno ovlivnit léky. Vzácně je nutná reoperace.

**Krvácení:** (vzácně) Jedná se o krvácení z větších cév v dutině břišní nebo z cév v blízkosti operovaného orgánu. Někdy je nutné převést laparoskopický výkon na otevřený. Výjimečně je nutné pro pokračující krvácení provést další operační výkon k zastavení krvácení. Při větší ztrátě krve je často nutné podání krevní transfuze.

**Komplikace hojení rány:** Může dojít ke krvácení z operační rány (občas), rozestupu okrajů operační rány (vzácně), zánětům kůže a podkoží u operační rány (občas), vzniku hypertrofické keloidní jizvy (občas). Infekce rány se projeví bolestivostí v ráně, zarudnutím, někdy tvorbou hnisu a zvýšenou teplotou. Tato komplikace si vyžádá opakované převazy. Větší krvácení nebo rozestup rány může vyžadovat operační revizi.

**Konkrétní komplikace související s operací:**

**Odumření části nebo celého laloku nebo nepřihojení části nebo celého transplantátu:** (občas) Řešením je odstranění odumřelé části a opakování výkonu.

**Snížená nebo vymizelá citlivost kůže:** (občas) Stav vzniká poraněním nervových vláken. Stav se většinou spontánně částečně nebo úplně upraví.

**Nerovnosti a nadbytek kůže:** (občas) Pokud není výsledek dobrý ani uspokojivý, je možné výkon zopakovat.

**Informace, zda existuje jiná alternativa či více alternativ, kromě navržené zdravotní služby či výkonu, jaký je jejich možný přínos, důsledky a rizika a poučení o možnosti volby:**

Bez zmíněné operace, úprava defektu kožním lalokem nebo transplantátem, je hojení možné otevřeně. Výhody jsou prevence zmíněných rizik, nevýhody jsou dlouhá doba hojení a vtažená jizva.

**Informace o možném omezení v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti, zdravotní způsobilosti, po poskytnutí zdravotní služby nebo provedení zdravotního výkonu, léčebném režimu, preventivních opatřeních, která jsou vhodná, případně o potřebě poskytnutí dalších zdravotních služeb:**

**Dieta** – nejsou žádná omezení. **Režimová opatření** – průměrná doba pracovní neschopnosti je 2-3 týdny (dle vykonávaného povolání), doporučuje se fyzické šetření operovaných oblastí. Do vyblednutí jizev není vhodné je vystavovat slunečnímu záření nebo docházet do solária. Pooperačně jsou vhodné masáže jizev a promazávání. Před operací se doporučuje přestat kouřit ke zlepšení prokrvení tkání a hojení. Po operaci proběhne několik ambulantních kontrol, stehy se odstraňují 8. - 12. den ambulantně.

**Prohlašuji,**

- že jsem byl/a poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli,
- že jsem lékařům nezamlčel/a žádné mně známé informace o mém zdravotním stavu, které by mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbu nebo ohrozit mé okolí, zejména rozšířením přenosné choroby,
- že jsem byl/a informován/a, že svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb mohu odvolat. Byl/a jsem rovněž poučen/a, že odvolání není účinné, pokud již bylo započato provádění výkonu, jehož přerušování může způsobit vážné poškození mého zdraví nebo ohrožení mého života,
- že podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a **vyslovuji svůj svobodný informovaný souhlas** s uvedenými zdravotními službami a výkony.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležitě odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.
- Současně vyslovuji souhlas s tím, aby byly provedeny i další zde neuvedené zákroky, výkony a poskytnuty další zdravotní služby, bude-li to potřebné pro ochranu mého života a zdraví a nebude-li možné vyžádat si další dodatečný informovaný souhlas. Beru na vědomí, že provedením zákroku, byť na náležitě odborné úrovni, nemusí být dosaženo předpokládaného výsledku.

Podpis pacienta (zákonného zástupce):

Poznámky lékaře k rozhovoru s pacientem:

Podpis lékaře:

Datum: